



Antikonvülzan İlaçlar:

İlaç	Yükleme Dozu	Hedef Doz	Kan Konsantrasyonu (mg/mL)	Yarılanma Ömrü (Saat)
Carbamazepine	10 mg/kg/day	20–30 mg/kg/day	4–12	14–27
Clonazepam	0.02 mg/day	0.5–1 mg/day	*	20–40
Ethosuximide	10 mg/kg/day	15–40 mg/kg/day	50–100	30–40
Felbamate	15 mg/kg/day	15–45 mg/kg/day	40–80	20–23
Lamotrigine (Valproat Dışı)	0.5 mg/kg/day	5–10 mg/kg/day	2–20	25 (Tek İlaç Olarak)
Levetiracetam	30 mg/kg/day	60 mg/kg	15–40	5
Oxcarbazepine	10 mg/kg/day	20–40 mg/kg/day	10–40	9
Phenobarbital	3–5 mg/kg/day	5–10 mg/kg/day	15–40	35–73
Phenytoin	5–10 mg/kg/day	5–10 mg/kg/day	10–25	24
Primidone	5 mg/kg/day	10–25 mg/kg/day	8–12	8–22
Topiramate	1–3 mg/kg/day	5–9 mg/kg/day	†	18–30
Valproate	20 mg/kg/day	30–60 mg/kg/day	50–100	6–15
Vigabatrin	40–60 mg/kg/day	60–80 mg/kg/day	†	Günler
Zonisamide	1.5 mg/kg/day	6 mg/kg/day	†	24

*Klinik olarak kullanışlı değil.

† Değerlendirilmedi.

Kaynak: Fenichel Pediatri Nöroloji

MEDİKAL LİNKLER

[DrTUS](#)

[Türk Pediatri Arşivi](#)

[Güncel Pediatri](#)

[Milli Pediatri](#)

[Allerji Ve Astım](#)

[Amerikan Pediatri Akademisi](#)

[Pediatrics Dergisi](#)

[Amerikan Allerji Derneği](#)

Sizce faydalı bir yazıymıydı?

Evet Hayır

☐
☐

Lütfen nerede hata yaptığımızı iletin

Gönder

Yasal Uyarı: Sitemizde yer alan hesaplamalar ve bilgiler ilgili kaynaklardan alınmış ve eğitim amaçlı olarak sitemize yerleştirilmiştir. Tedavi amaçlı kullanımda sorumluluk klinisyene aittir. Sitemiz bu konuda sorumlu tutulamaz.